

DOSAGGIO CATECOLAMINE, METANEFRINE, NORMETANEFRINE ACIDO VANILMANDELICO, ACIDO 5-OH-INDOLOACETICO, 17-CHETOSTEROIDI, ACIDO OSSALICO, CORTISOLO, MAGNESIO NELLE URINE DELLE 24H

Materiale fornito:

- Contenitore urine 24h
- Guanti
- Fialetta di Acido Cloridrico (HCl) concentrato (da conservare al buio e in un luogo fresco)

NB: Provoca ustioni. Irritante per le vie respiratorie.

Vedi *Interventi di Primo Soccorso* a piè pagina.

Istruzioni per la raccolta:

- Iniziare la raccolta dalle seconde urine del mattino fino alle prime (comprese) del mattino successivo.
- Versare le prime urine nel contenitore per le 24h.
- Indossare i guanti protettivi e versare la fialetta di acido cloridrico avendo cura di non creare schizzi. Attenzione, potrebbe verificarsi una piccola produzione di vapori o nebbie: NON INALARE.
- Raccogliere le successive urine in contenitori esterni e quindi versarle di volta in volta nel contenitore delle 24h, facendo sempre attenzione a non provocare schizzi.
- Conclusa la raccolta, assicurarsi di chiudere bene il tappo e trasportare il contenitore mantenendolo in posizione verticale al fine di evitare delle perdite.
- **RIPORTARE IN LABORATORIO IL VUOTO DELLA FIALETTA DI ACIDO CLORIDRICO.**

Note particolari: A partire da 48 ore precedenti e per tutto il tempo della raccolta, è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: agrumi, ananas, avocado, banane, kiwi, more, prugne, melanzane, pomodori, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante lo stesso periodo, previa consultazione del medico curante, si consiglia di evitare l'assunzione di farmaci.

Interventi di Primo Soccorso

Informazione generale

Consultare un medico e mostrare il presente modulo.

Se inalato

Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca, lontano dalla fonte pericolosa. In casi gravi di arresto della respirazione, procedere con la respirazione artificiale. Consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle

Lavare bene la pelle con sapone e abbondanti quantità d'acqua. Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate, lavarli prima di usarli di nuovo. Consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi

Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi ad un medico.

Se ingerito

NON indurre il vomito. Sciacquare la bocca con acqua. Non somministrare alcunché a persone svenute. Consultare un medico.

